

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Ferre

Aud

omme

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n°15 du 23 juillet 2008 - 1 page

Mildiou

Aucune contamination n'a été enregistrée sur les différents postes depuis la semaine dernière.

Toutefois, compte tenu de la pression de la maladie, maintenez la protection fongicide.

Ravageurs

Pucerons

Les populations de pucerons sont nulles à l'exception de certains sites tels que Chambry (77) avec 88% de folioles porteuses de pucerons et Iverny (77) avec 13%.

Doryphores

Des larves doryphores ont été observées à Auvers sur Oise (95) et Méréville (91).

Observez vos parcelles et intervenez dès la présence importante de larves au stade larvaire L1-L2.

ERRATUM concernant le défanage

Dans le bulletin de la semaine dernière, une erreur s'est glissée concernant les doses d'utilisation du BASTA F1. Seules 2 applications maximum à 2,5L/ha en respectant 5 jours d'intervalle entre les deux applications sont autorisées (voir le tableau modifié). Veuillez nous excuser.



MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÉCHE

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Agriculture et de la Forêt Service Régional de la Protection des Végétaux IJ.E DE FRANCE 10 rue du séminaire 94516 RUNGIS cedex Tél: 01-41-73-48-00 Fax: 01-41-73-48-48

Bulletin réalisé avec la participation de la FREDON Ile de France

Imprimé à la station D'Avertissements Agricoles de Rungis Directeur gérant : N. THERRE Les réductions de doses de défanant sont possibles sur végétation sénescente. Il est préférable de fractionner les applications sur végétation forte.

91 5: 100 (- 85-11)

P19